

Intervención de
Cirugía Maxilofacial
con los doctores
Carlos Salcedo, Paola
Sambo y Sergi
Janeiro • QUIRÓNSALUD

Cirugía Maxilofacial de alta complejidad para la recuperación de la oclusión dental y la apertura bucal en Clínica Rotger

► LOS DOCTORES CARLOS
SALCEDO, PAOLA SAMBO
Y SERGI JANEIRO SON
ESPECIALISTAS EN
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
MAXILOFACIALES

¿Conoces todas las novedades de
Quirónsalud en Baleares?



Entra aquí y descubre todas las opciones
para el cuidado de tu salud.



Accede online a tus resultados y gestiona
tus citas en el área "Mi Quirónsalud"
de [quironsalud.es](https://www.quironsalud.es), o en nuestra App.



[quironsalud.es](https://www.quironsalud.es)     



Clínica Rotger
desde 1944
Grupo Quirónsalud



Hospital
Palmaplanas



Equipo de Cirugía Maxilofacial en una intervención de alta complejidad en Clínica Rotger. QUIRÓNSALUD



Dr. Sergi Janeiro, especialista maxilofacial.

CLÍNICA ROTGER


Recuperación de la oclusión dental y la apertura bucal mediante el abordaje de la deformidad dentofacial compleja

Los quirófanos de alta complejidad del Área Quirúrgica de Clínica Rotger facilitan estas intervenciones

REDACCIÓN. PALMA

■ Se trata de un caso en el que el paciente presenta una deformidad facial tras una fractura mandibular compleja. Transcurrido un tiempo, el paciente desarrolla retrusión mandibular, limitante para la apertura oral y la masticación.

En este momento del proceso el paciente acude al Servicio de Cirugía Maxilofacial de Clínica Rotger que realiza una minuciosa evaluación del caso. Los doctores Carlos Salcedo, Paola Sambo y Sergi Janeiro especialistas maxilofaciales detectan la presencia de formación de hueso alrededor del callo de fractura a nivel articular, un hallazgo que sugiere el comienzo de una posible anquilosis temporomandibular, es decir un bloque óseo que imposibilita la apertura.



Estudio tridimensional para el abordaje quirúrgico



Plan de tratamiento quirúrgico maxilofacial personalizado

El equipo quirúrgico de Clínica Rotger diseñó un plan de tratamiento quirúrgico para abordar de

EL SERVICIO DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL HA REALIZADO LA INTERVENCIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD A UN PACIENTE AFECTADO POR UNA RARA DEFORMIDAD DENTOFACIAL QUE HA MEJORADO SIGNIFICATIVAMENTE SU MOVIMIENTO NATURAL Y SU CALIDAD DE VIDA

manera integral estas complejas condiciones. Hace unos meses, se realizó una Cirugía de Recambio Articular Total Derecho acompañada de Cirugía Ortognática Funcional Mandibular: Esta cirugía tiene como objetivo sustituir la articulación que muestra signos iniciales de anquilosis por una prótesis diseñada y construida a medida para el paciente. Además, se realizó una osteotomía sagital mandibular del lado contrario para reposicionar la arcada dental mandibular para normalizar la oclusión dental del paciente

Actualmente, transcurrido un tiempo prudencial desde la intervención, la evolución es muy satisfactoria. El paciente ha recuperado su oclusión dental y la apertura bucal con un normal funcionamiento de la articulación temporomandibular, es decir de los movimientos normales de la mandíbula.

Según explica el doctor Sergi Janeiro: «Comprendemos la importancia de ofrecer tratamientos personalizados y avanzados a cada paciente con patologías del territorio maxilofacial». El especialista en Cirugía maxilofacial añade: «Actualmente, los estudios individualizados con equipos 3D y las últimas tecnologías, permiten planificar la cirugía y determinar el enfoque más adecuado para cada paciente». De esta forma, el enfoque multidisciplinario y la experiencia de los profesionales consigue un cuidado integral que logra resultados exitosos orientados siempre a mejorar la vida de los pacientes.

Los quirófanos de alta complejidad de la nueva Área Quirúrgica de Clínica Rotger facilitan este tipo de intervenciones que requieren de la participación de equipos multidisciplinares y la aplicación de estudios tridimensionales, así como planificaciones previas que guían los pasos de los cirujanos durante todo el proceso, ampliando así las garantías de seguridad del paciente antes, durante y después de la intervención.